

Suomen Welsh Corgi Seura ry
Hallitus

Esitys PEVISA-ohjelmista anottavaksi Kennelliitosta ajalle 1.1.2027 – 31.12.2031

Welsh corgi cardigan

Koirilla tulee astutushetkellä olla virallinen laajempi selkäkuvaus- (LTV, VA, SP, IDD), lonkkakuvaus- ja kyynärnivelen inkongruenssiläusunto tai aiempi kyynärnivelläusunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kuukautta vanhempi.

Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

Selkätuloksen IDD3 saanut koira voidaan parittaa vain IDD0 tai IDD1 saaneen koiran kanssa.

Inkongruenssiläusunnon 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa.

Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Koiran väri on ilmoitettava rekisteröinnin yhteydessä.

Uusintayhdistelmät ovat kiellettyjä.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (narttu 1, uros 2 pentuetta).

Welsh corgi pembroke

Koirilla tulee astutushetkellä olla virallinen laajempi selkäkuvaus- (LTV, VA, SP, IDD), lonkkakuvaus- ja kyynärnivelen inkongruenssiläusunto tai aiempi kyynärnivelläusunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kuukautta vanhempi.

Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.

Lonkkien osalta esitetään päätettäväksi kahden eri vaihtoehdon välillä:

Vaihtoehto A: Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa ja pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

Vaihtoehto B: Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

Selkätuloksen raja-arvo on IDD2. IDD2 tuloksen saaneen koiran voi parittaa vain IDD0 tai IDD1 tuloksen saaneen koiran kanssa.

Inkongruenssilausunnon 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa.

Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

Uusintayhdistelmät ovat kiellettyjä.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta).

Huomioitavaa esityksessä on, että pembroken osalta esitetään kahta eri vaihtoehtoa D-lonkkaisen koiran jalostuskäytölle. Vaihtoehto A edellyttää molempien ehtojen täyttymistä. Tällöin edistyminen lonkka-asteiden paranemisen suhteen voi olla nopeampaa, mutta kaventaa jalostusmateriaalia. Vaihtoehto B:ssä riittää toisen ehdon toteutuminen. Indeksien hyödyntäminen mahdollistaa edistymisen, mutta käyttöön jää enemmän jalostusmateriaalia.

Asiasta järjestettiin neuvoa antava äänestys PEVISA-ohjelmia esittelevässä tilaisuudessa ja tulos oli sen verran tasaväkinen, että hallitus on päättänyt jättää asian vuosikokoukselle ratkaistavaksi.